

Trichoben toedienen

Om bijwerkingen te voorkomen, is het belangrijk om onderstaande instructies goed op te volgen.

1. Ontsmetten

ONTSMET HET OPPERVLAKTE
van huid en de stop
(zie SPC punt 4.9).



Deze instructies zijn conform bijsluiter en SPC van REG NL 121040.

Om de infectiedruk binnen een koppel zo laag mogelijk te houden, adviseren wij om alle dieren in het betreffende koppel te vaccineren of (als dat niet kan) de gevaccineerde dieren gescheiden te houden van de niet gevaccineerde dieren.



SPC + VIDEO
INSTRUCTIE

2. Goed schudden

Maak het vaccin gebruiksklaar volgens bijsluiter.

SCHUD HET VACCIN
vóór toediening.

Daarna **DIRECT TOEDIENEN**
(zie SPC punt 6.3).



! Het bewaren en later toedienen van reeds opgeloste vaccin vergroot de kans op potentiële ent-reacties.

3. Direct toedienen op de juiste plek

Wijze van toediening: intramusculair

✓ **IN HET LUMBALE OF GLUTEALE GEBIED**
✗ **NIET IN DE NEK**

Vaccinatie en hervaccinatie dienen in het linker- en respectievelijk rechterdeel van het lichaam plaats te vinden (zie SPC punt 4.9).

Vanwege de grootte van de gluteale spier, wordt het vaccin over een grotere spiermassa verdeeld en is de kans op entreacties kleiner.

